

CKDの重症度分類

原疾患		蛋白尿区分		A1	A2	A3
糖尿病	尿アルブミン定量 (mg/日)	正常	微量 アルブミン尿	正常	微量 アルブミン尿	顕性 アルブミン尿
	尿アルブミン/Cr比 (mg/gCr)	30未満	30~299	300以上		
高血圧 腎炎 多発性のう胞 腎移植 不明	尿蛋白定量 (g/日)	正常	軽度蛋白尿	高度蛋白尿		
	尿蛋白/Cr比 (g/gCr)	0.15未満	0.15~0.49	0.50以上		
GFR区分 (ml/分 /1.73m ²)	G1	正常 or 高値	≥90			
	G2	正常 or 軽度低値	60~89			
	G3a	軽度~ 中等度低下	45~59			
	G3b	中等度~ 高度低下	30~44			
	G4	高度低下	15~29			
	G5	末期腎不全	<15			

Copyright (C) 2015. Dept. of Nephrology, Toho Univ.
(KDIGO CKD guideline 2012を日本人用に改変)

重症度は原疾患・GFR区分・蛋白尿区分を合わせたステージにより評価する。
CKDの重症度は死亡、末期腎不全、心血管死亡発症のリスクを緑■の
ステージを基準に、黄■，オレンジ■，赤■の順にステージが上昇する
ほどリスクは上昇する。