

参考：副作用症状（CTCAE ver5.0）

| 項目 | 定義 | Grade1 | Grade2 | Grade3 | Grade4 | Grade5 |
|------|----------------------|---|---|--|---|--------|
| 悪心 | ・ムカムカ感や嘔吐の衝動 | ・ 摂食習慣に影響のない食欲低下 | ・ 顕著な体重減少、脱水または栄養失調を伴わない経口摂取量減少 | ・ カロリーや水分の経口摂取が不十分、経管栄養/TPN/入院を要する | - | - |
| 嘔吐 | ・ 胃内容が口から逆流性に排出されること | ・ 治療を要さない | ・ 外来での静脈内輸液を要する；内科的治療を要する | ・ 経管栄養/TPN/入院を要する | ・ 生命を脅かす | 死亡 |
| 食欲不振 | ・ 食欲の低下 | ・ 摂食習慣の変化を伴わない食欲低下 | ・ 顕著な体重減少、脱水または栄養失調を伴わない経口摂取量減少 ・ 経口栄養剤による補充を要する | ・ 顕著な体重減少または栄養失調を伴う ・ 静脈内輸液/経管栄養 | ・ 生命を脅かす ・ 緊急の処置を要する | 死亡 |
| 倦怠感 | ・ 全身的な不快感、だるさ、元気がない | ・ だるさがある、または元気がない | ・ 身の回りの日常生活動作を制限するだるさがある、または元気がない状態 | ・ 身の回りの日常生活動作を制限するだるさがある。または元気がない。 | - | - |
| 高血圧 | ・ 病的な血圧の上昇 | ・ 収縮期血圧：120-139mmHg または拡張期血圧：80-89mmHg | ・ ベースラインが正常範囲の場合は収縮期血圧：140-159mmHg または拡張期血圧：90-99mmHg； ・ ベースラインで行っていた内科的治療の変更を要する ・ 再発または持続性（ ≥ 24 時間） ・ 症状を伴う > 20 mmHg（拡張期血圧）の上昇または以前正常であった場合は $> 140/90$ mmHgへの上昇 ・ 単剤の薬物治療を有する | ・ 収縮期血圧 ≥ 160 mmHgまたは拡張期血圧 ≥ 100 mmHg ・ 内科的治療を要する ・ 2種類以上の薬物治療または以前よりも強い治療を要する | ・ 生命を脅かす （例：悪性高血圧、一過性または恒久的な神経障害、高血圧クリーゼ） ・ 緊急の処置を要する | 死亡 |