

深谷赤十字病院 化学療法レジメン

対象疾患名 大腸がん

催吐リスク 中等度

レジメン名 SOX±BV療法

1コースの日数 1コース 21日

レジメン内容

| Rp | 抗がん剤名 (溶解液等を含む) | 標準的投与量 | 投与方法 | 投与時間 | Day | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|-------------------------------|------|----------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 1 | 生食注 (メインルート) | 500mL | 点滴静注 | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | グラニセトロン注 デキサメタゾン注 生食注 | 1mg 6.6mg 50mL | 点滴静注 | 15分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ベバシズマブ注 生食注 | 7.5mg/kg 100mL | 点滴静注 | 初回:90分 以降30分まで短縮可 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | オキサリプラチン注 5%ブドウ糖注 | 130mg/m ² 250mL | 点滴静注 | 120分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | エスワン | 80mg/m ² | 内服 | | 朝 | → | | | | | | | | | | | | | | 朝 | | | | | | |
| | | | | | 夕 | → | | | | | | | | | | | | | | 夕 | | | | | | |