深谷赤十字病院　化学療法レジメン

対象疾患名　非小細胞肺がん　　催吐リスク　最小度

レジメン名　ペムブロリズマブ＋PEM療法

1コースの日数　1コース　21日

レジメン内容

| Rp | 抗がん剤名<br>（溶解液等を含む） | 標準的投与量 | 投与方法 | 投与時間 | Day | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | 生食注 | 50mL | 点滴静注 | 15分 | ⇩ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ペムブロリズマブ注<br>生食注 | 200mg<br>100mL | 点滴静注 | 30分 | ⇩ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 生食注<br>（ルート洗浄） | 100mL | 点滴静注 | 5分 | ⇩ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | デキサメタゾン注<br>生食注 | 6.6mg<br>50mL | 点滴静注 | 15分 | ⇩ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ペメトレキセド注<br>生食注 | 500mg/$m^2$<br>100mL | 点滴静注 | 10分 | ⇩ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 生食注 | 50mL | 点滴静注 | 5分 | ⇩ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |