

深谷赤十字病院 化学療法レジメン

対象疾患名 悪性リンパ腫

催吐リスク 高度

レジメン名 R-THP・COP療法

1コースの日数 1コース 21日

レジメン内容

Rp	抗がん剤名 (溶解液等を含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	ヒドロコルチゾン注 クロルフェニラミン注 生食注	100mg 5mg 100mL	点滴静注	30分	↓																				
2	リツキシマブ注 生食注	375mg/m ² 10倍希釈	点滴静注	※	↓																				
3	グラニセトロン注 生食注	1mg 50mL	点滴静注	30分		↓																			
4	ピラルピシン注 生食注	50mg/m ² 100mL	点滴静注	15分		↓																			
5	ピンクリスチン注 生食注	1.4mg/m ² 100mL	点滴静注	15分		↓																			
6	シクロホスファミド注 生食注	750mg/m ² 500mL	点滴静注	60分		↓																			
7	生食注	50mL	点滴静注	5分	↓	↓																			
8	プレドニゾン	100mg	内服			↓	↓	↓	↓	↓															

※ 最初の30分 50ml/hrその後30分毎に50ml/hrずつ上げて
 最大400ml/hrまで上げることができ
 2回目以降 100ml/hrまで上げて開始しその後30分毎に100ml/hrずつ上げて
 最大400ml/hrまで上げることができ